

*CRYPTOCÉPHALIDES NOUVEAUX DE MADAGASCAR [COL.]*,

PAR M. M. PIC.

Les Cryptocéphalides (Coléoptères Phytophages) décrits dans cet article proviennent de la riche collection de feu le major Sicard, qui a été léguée au laboratoire d'Entomologie du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, et les types en font partie. Des co-types des nouveautés suivantes : *C. Sicardi*, v. *intripartitus*, *ambrensis*, *minimus* v. *inlineolatus* et var. *subbrunneofasciatus* figurent, en outre, dans la collection Pic.

***Cryptocephalus luteoannulatus* n. sp.**

*Oblongus, valde convexus, niger, supra diverse luteo signatus, membris rufis aut luteis, infra corpore nigro, abdomine apice rufo.*

Oblong, très convexe, dessus brillant, noir et jaune, dessous du corps peu brillant, éparsément pubescent, noir, abdomen roux au sommet, membres roux et jaunes. Tête jaune, à macule frontale noire, labre foncé, finement ponctué, yeux écartés; antennes testacées, peu grêles; prothorax bombé, court et large, rétréci en avant, peu ponctué, largement jaune sur les côtés avec une macule incluse latérale noire, noir sur le milieu avec une ligne médiane jaune; écusson noir; élytres bombés, assez courts et très atténués postérieurement, à rangées de points très fins et espacés, noir, avec, sur chacun, trois fascies jaunes de formes différentes, la 1<sup>re</sup> basale, courte, la 2<sup>e</sup> médiane sinuée, isolée de la suture mais touchant le bord où elle s'élargit, la 3<sup>e</sup> arquée, près du sommet; pygidium noir à grande macule jaune; pattes rousses et jaunes, assez robustes. Long. 7 mm.

Madagascar, sans localité mentionnée.

Espèce pouvant prendre place dans le voisinage de *C. fractiscriptus* Frm., caractérisée par sa forme robuste et très convexe conjointement à sa particulière coloration.

***Cryptocephalus luteoannulatus* v. nov. *luteointerruptus*.**

*Signaturis luteis reductis, supra niger infra corpore rubro, lateraliter et apice nigro.*

*Bulletin du Muséum*, 2<sup>e</sup> s., t. IV, n<sup>o</sup> 6, 1932.

Cette variété est caractérisée par les dessins jaunes réduits et ainsi composés : sur le prothorax à un demi-cercle latéral jaune et deux macules, antérieure et postérieure médianes ; sur les élytres, et sur chacun, à 1 macule basale, deux médianes transversalement disposées et une fascie antéapicale arquée en sens contraire, de celle (analogue) de la forme typique. Long. 5,5 mm.

M<sup>t</sup> d'Ambre, en octobre (D<sup>r</sup> Sicard).

**Cryptocephalus luteovittatus** n. sp.

*Oblongo-elongatus, parum nitidus, rufo-brunnescens, elytris in disco tuteo et sinuate linealis.*

Oblong-allongé, peu brillant, roux brunâtre avec chaque élytre orné d'une bande discale jaune, un peu sinuée, partant de la base sans atteindre le sommet. Tête fortement ponctuée, yeux écartés ; antennes grêles, foncées, à base rousse ; prothorax court, rétréci en avant, à ponctuation moyenne et écartée ; élytres peu longs, atténués postérieurement, à rangées de points médiocres ; dessous un peu pubescent, roux avec les pattes un peu plus claires. Long. 4 mm.

M<sup>t</sup> d'Ambre, en mai (D<sup>r</sup> Sicard).

Sans doute voisin de *C. semivittatus* Frm., mais coloration élytrale moins foncée et forme non ovalaire.

**Cryptocephalus testaceopectoralis** n. sp.

*Oblongus, nitidus, rufus aut testaceus, scutello elytrisque nigris.*

Oblong, brillant, roux, en partie testacé, écusson et élytres noirs. Tête peu ponctuée, faiblement sillonnée, yeux foncés, écartés ; prothorax roux, court et large, un peu rétréci en avant, à peine ponctué ; élytres peu longs, subparallèles, à rangées de points assez gros ; dessous du corps avec les pattes plus ou moins testacés, pygidium testacé. Long. 3 mm.

Madagascar, sans localité mentionnée.

Voisin de *C. atropectoralis* Pic, s'en distingue par la forme moins robuste, la poitrine claire, etc.

**Cryptocephalus Sicardi** n. sp.

*Oblongus, nitidus, rufus, elytris ad basin et apice viridi-metallicis, membris pro majore parte nigris.*

Oblong, brillant, roux avec les élytres d'un vert métallique à la base et à l'extrémité, membres foncés, base des antennes et aussi en partie celle des cuisses rousses. Tête modérément ponctuée,

impressionnée entre les yeux, qui sont assez écartés; antennes grêles; prothorax assez court, atténué en avant, peu ponctué; écusson roux; élytres assez courts, atténués postérieurement; à rangées de points assez forts, nettement impressionnés en avant; dessous du corps roux, un peu pubescent; pattes peu robustes. Long. 4 mm.

Tananarive et M<sup>t</sup> d'Ambre, février et novembre (D<sup>r</sup> Sicard). Peut se placer près de *C. cæruleomaculatus* Frm.; s'en distingue par les dessins foncés des élytres qui sont différents et le prothorax immaculé.

#### **Cryptocephalus brunneoannulatus** n. sp.

*Oblongus, parum convexus, nitidus, niger, capite antice, thorace, elytris, sutura nigra excepta, pedibusque pro parte testaceis, femoribus brunneo annulatis.*

Oblong, peu convexe, brillant, en partie noir, en partie testacé avec le milieu du prothorax et des cuisses teintés de brun. Tête noire avec les parties antérieures testacées, modérément ponctuée, yeux un peu écartés; antennes noires, à base testacée, grêles; prothorax, court, rétréci en avant, finement et éparsément ponctué; écusson noir; élytres testacés, à suture noire, assez courts et sub-parallèles, nettement, mais non profondément striés-ponctués, peu impressionnés en avant; dessous du corps peu pubescent; pattes peu grêles, tibias antérieurs un peu arqués. Long. 5 mm. environ.

M<sup>t</sup> d'Ambre, en septembre (D<sup>r</sup> Sicard).

Peut se placer près de *C. substriatus* Frm.; en diffère par la coloration différente, la suture noire, etc.

#### **Cryptocephalus 5-maculatus** n. sp.

*Robustus et brevis, nitidus, antennis ad basin, tibiis, tarsis, thorace pro parte et elytris luteis, his quinque viridi maculatis.*

Robuste et court, brillant, noir avec partie des membres testacés; prothorax noir, à large bordure sinuée jaune latérale et antérieure avec, en plus, deux grandes macules postérieures jaunes; élytres d'un jaune paille avec 5 macules vertes, l'une commune, placée sur la suture derrière l'écusson et deux discales, sur chacun de ces organes, la première placée sur les épaules, la 2<sup>e</sup> en dessous du milieu. Tête diversement ponctuée, yeux assez rapprochés; antennes jaunes, rembrunies à l'extrémité, grêles; prothorax bombé, rétréci en avant, large en arrière avec la partie postérieure médiane surélevée au-dessus de l'écusson, peu ponctué; écusson noir; élytres courts et larges, atténués postérieurement, un peu

déhiscents au sommet, fortement impressionnés en avant, à rangées de points assez forts; pattes grêles, cuisses foncées, le reste clair; dessous du corps et pygidium noirs, densément revêtus de poils argentés; pygidium fovéolé postérieurement. Long. 6 mm.

Grande Terre.

Espèce remarquable par sa forme courte et robuste jointe à sa particulière coloration du dessus du corps. Peut se placer près de *C. robustissimus* Pic.

. **Cryptocephalus bipartitipennis** n. sp.

*Oblongus, nitidus, nigro-piceus supra viridi metallicus, elytris postice testaceis, antennis ad basin pedibusque pro parte testaceis.*

Tête nettement et non densément ponctuée, yeux peu écartés; antennes grêles et longues, noires à base testacée; prothorax court, atténué en avant, élargi en arrière, fortement rebordé, d'un vert métallique foncé avec la marge en partie teintée de clair, peu ponctué; écusson vert; élytres peu longs, un peu étranglés derrière les épaules et atténués postérieurement, à rangées de points forts un peu embrouillés près de l'écusson, peu impressionnés en avant, verts sur près de la moitié basale, testacés avec des reflets irisés sur le reste; dessous du corps foncé à pubescence argentée; pygidium foncé à base testacée; pattes testacées avec les fémurs, ou tarses, en partie foncés, les tibias noirs. Long. 4,5 mm.

M<sup>t</sup> d'Ambre, en octobre (D<sup>r</sup> Sicard).

Cette espèce, de coloration particulière, peut prendre place près de *C. Gallienii* Pic; elle s'en distingue, à première vue, en plus de la coloration bicolore des élytres, par leur ponctuation plus forte.

**Cryptocephalus tripartitus**, v. nov. **intripartitus**.

*Niger, thorace aliquot paulo rufo notato, elytris testaceis.* Long. 4 mm.

M<sup>t</sup> d'Ambre, en décembre (D<sup>r</sup> Sicard).

Variété distincte, à première vue, de la forme typique, par les élytres concolores, clairs.

**Cryptocephalus ambrensis** n. sp.

*Oblongus, nitidus, rufus, antennis apice tarsisque nigris, articulis 3-5 antennarum elongatis et testaceis, sequentibus dilatatis et nigris.*

Oblong, brillant, roux avec les articles 6 et suivants des antennes, ceux-ci épaissis, noirs ainsi que les tarses. Tête à ponctuation fine et écartée; yeux écartés, foncés; antennes grêles à la base, épaissies

sur leur deuxième moitié, bicolores; prothorax court et large, atténué en avant, finement et éparsément ponctué; écusson roux; élytres assez courts, atténués postérieurement, à rangées de points médiocres ou fins, peu impressionnés en avant; dessous du corps peu pubescent; pattes un peu robustes et longues, tarses élargis. Long. 4,5 mm.

M<sup>t</sup> d'Ambre, en octobre et décembre (D<sup>r</sup> Sicard).

Ressemble à *C. piceorufus* Frm.; distinct, à première vue, par la particulière structure, celle-ci mi-épaissie, des antennes.

#### **Cryptocephalus minimus** n. sp.

*Oblongus, nitidus, rufus, antennis apice, tibiis pro parte tarsisque nigris, articulis 3-5 antennarum elongatis, 6 et sequentibus valde dilatatis.*

Oblong, brillant, roux avec les antennes noires et dilatées sur leur deuxième moitié, le sommet des tibias et les tarses noirs; élytres à rangées de points médiocres ou fins, pattes assez robustes. Long. 2-2,5 mm.

M<sup>t</sup> d'Ambre. Janvier et décembre (D<sup>r</sup> Sicard).

Diffère du précédent par sa petite taille et les tibias bicolores.

#### **Cryptocephalus minutus**, v. nov. **inlineolatus**.

*Supra fere uniformiter rufus, signaturis luteis indistinctis, pedibus late flavis.* Long. 2 mm.

M<sup>t</sup> d'Ambre, février et décembre (D<sup>r</sup> Sicard).

Variété caractérisée par l'oblitération des dessins jaunes de la forme typique, notamment les linéoles des élytres.

#### **Cryptocephalus Perrieri**, v. nov. **subbrunneofasciatus**.

*Elytris brunneo bifasciatis.* Long. 2 mm. M<sup>t</sup> d'Ambre.

Élytres avec les dessins de la forme typique, mais tirant sur le brun, non maculiformes en arrière mais fasciés, les fascies étant plus ou moins sinuées.